

FOUGÈRES RÉCOLTÉES PAR M. MOURET EN INDO-CHINE,

PAR M. ED. JEANPERT.

M. Mouret, Sous-Lieutenant d'Infanterie coloniale, a fait don au Muséum des plantes qu'il a récoltées pendant son séjour en Indo-Chine.

Parmi les 46 Cryptogames de cette collection, j'ai pu déterminer les Fougères suivantes ⁽¹⁾ :

GLEICHENIA LINEARIS Clarke. — N° 21, Sept-Pagodes.

LINDSAYA HETEROPHYLLA Dry. — N°s 2 et 20, Sept-Pagodes.

L. ENSIFOLIA Sw. — N° 13, Sept-Pagodes.

ADIANTUM FLABELLULATUM L. — N° 19, Sept-Pagodes.

CHEILANTHES TENUIFOLIA Sw. — N°s 17 et 18, Sept-Pagodes.

PTERIS LONGIFOLIA L. — N°s 7 et 8, Nam-Dinh.

P. ENSIFORMIS Burm. — Ceylan.

P. SEMIPINNATA L. — N°s 4 et 6, Lam; n° 16, Sept-Pagodes.

PTERIDIUM AQUILINUM Kuhn. — N° 9, Lam; n° 15, Sept-Pagodes.

CERATOPTERIS THALICTROIDES Brongn. — N° 23, Nam-Dinh; n° 40, Sept-Pagodes.

BLECHNUM ORIENTALE L. — N° 5, Lam.

ASPENIUM BELANGERI Kunze. — N° 1, Sept-Pagodes, cult.

DIPLAZIUM ESCULENTUM Sw. — N° 34, Nam-Dinh.

NEPHRODIUM UNITUM R. Br. — N° 33, Nam-Dinh; n° 35, Sept-Pagodes.

POLYPODIUM PROLIFERUM Roxb. — N° 32, Nam-Dinh.

P. ELLIPTICUM Thunb. (GYMNOGRAMME Bak.). — N°s 22 et 25, Nam-Dinh.

MENISCIUM TRIPHYLLUM Sw. — N° 24, Nam-Dinh.

HEMIONITIS ARIFOLIA Moore. — Ceylan.

LYGODIUM SCANDENS Sw. — N°s 26, 27, 28, 29, Nam-Dinh.

L. JAPONICUM Sw. — N° 31, Nam-Dinh.

L. POLYSTACHYUM Wall. — N° 3, Lam; n° 14, Sept-Pagodes.

LYCOPodium CERNUUM L. — N°s 41 et 42, Sept-Pagodes.


⁽¹⁾ Voir ce *Bulletin* (1908), p. 163 : F. GAGNEPAIN, Une nouvelle collection de plantes indo-chinoises.

NOTE SUR UNE MONSTRUOSITÉ DE *CYPRIPEDIUM* PAR AVORTEMENT
DE PLUSIEURS PIÈCES FLORALES,

PAR M. H. POISSON.

Le sujet de cette observation est un *Cypripedium Lawrenceanum* Reich f. envoyé au service de la Culture par M. Leseur, horticulteur à Saint-Cloud.

Cette fleur présente d'abord deux pièces bien visibles : le sépale dorsal et un des pétales latéraux. Le sépale supérieur est fortement déjeté du côté droit, tandis que le pétale est au contraire vertical. Ces deux pièces ont la coloration et la forme de la fleur normale et permettent parfaitement



d'identifier l'espèce (fig. 1). En entr'ouvrant la collerette formée par les deux pièces bien développées, on voit au milieu une petite colonne vert clair, un peu recourbée au sommet qui est en massue. Cet organe a 8 millimètres de haut sur 2 millimètres de large. — Sur cette colonne et dans un creux correspondant à la convexité de la massue s'articule une pièce bizarre, rappelant un peu une tête de bœuf qui serait aplatie en avant. Cette partie est blanche, marginée de pourpre pâle et recouverte de poils de même couleur. Si l'on regarde la fleur de profil, et à gauche, on aperçoit près de l'articulation une masse ovoïde brun foncé, parcourue par